

## ლექცია 7

### 5. ფუნქციები

#### 5.1. ფუნქციები და ბრაზიკები

**განსაზღვრა 5.1.1.**  $x$  ცვლადის ფუნქცია არის  $f$  წესი, რომელიც  $x$ -ის ყოველ მნიშვნელობას უთანადებს ერთადერთ  $f(x)$  რიცხვს, რომელსაც  $y$ -ით აღნიშნავენ. ყოველივე ამას ჩავწერთ შემდეგნაირად:

$$y = f(x). \tag{5.1.1}$$

$x$ -ის ცვლილების  $X$  სიმრავლეს განსაზღვრის არე ეწოდება, ხოლო  $y$ -ის ( $f(x)$ -ის) მნიშვნელობათა  $Y$  სიმრავლეს – ფუნქციის მნიშვნელობათა არე. სხვა სიტყვებით,  $f$  ფუნქცია არის  $X$  სიმრავლის  $Y$  სიმრავლეზე ასახვა, რაც შემდეგნაირად აღინიშნება:

$$f: X \rightarrow Y \quad (x \mapsto f(x)). \tag{5.1.2}$$


(5.1.1) და (5.1.2) აღნიშვნები ერთსა და იმავე  $f$  ფუნქციას (ასახვას) გამოხატავს.  $x$ -ს დამოუკიდებელი, ხოლო  $y$ -ს დამოკიდებული ცვლადი ეწოდება.

**განსაზღვრა 5.1.2.** ფუნქციის გრაფიკი ეწოდება  $(x, f(x))$  დალაგებული წყვილების შესაბამის წერტილთა სიმრავლეს  $Oxy$  კოორდინატთა სისტემაში, როცა  $x$  გაირბენს თავისი განსაზღვრის მთელ  $X$  არეს (სიმრავლეს).


ფუნქციის გრაფიკის მაგალითებია ჩვენ მიერ ადრე განხილული წრფე, წრეწირი და პარაბოლა, რომელთა შესაბამის ფუნქციებს მივიღებთ მათი განტოლებების  $y$ -ის მიმართ ამოხსნით:

$$y = kx + b, \quad y = \pm\sqrt{r^2 - x^2}, \quad y = 4px^2, \tag{5.1.3}$$

სადაც  $k$ ,  $b$  და  $p$  მუდმივებია (“+” ფესვის წინ შეესაბამება ზედა ნახევარწრეწირს, ხოლო “-“ – ქვედა ნახევარწრეწირს). ფუნქციის განმარტებიდან გამომდინარე, წირი ნახ. 5.1.1-ზე გამოხატავს



ნახ.5.1.1



ნახ.5.1.2

ფუნქციას (რადგან ვერტიკალური წრფე წირს მხოლოდ ერთ წერტილში გადაკვეთს), ხოლო ნახ. 5.1.2-ზე გამოსახული წირი არ გამოხატავს ფუნქციას (რადგან ვერტიკალური წრფე წირს ერთზე მეტ წერტილში გადაკვეთს და ყოველი  $x$ -ის შესაბამისი მნიშვნელობა ცალსახად არ იქნება განსაზღვრული; სხვა სიტყვებით, ყოველ  $x$ -ს შეესაბამება რამდენიმე, სახელდობრ 3, მნიშ-

ენელობა, მაშინ, როდესაც ფუნქციის ცნება მოითხოვს, რომ  $x$ -ს  $y$ -ის მხოლოდ ერთი მნიშვნელობა შეესაბამებოდეს.\*)

(5.1.3) ფუნქციები წარმოადგენს ფუნქციის გამჭვირვალე მაგალითებს, რამდენადაც ისინი ერთი ფორმულით არიან წარმოდგენილი. თავდაპირველად მათემატიკოსები მხოლოდ ასეთ ფუნქციებს განიხილავდნენ. ფუნქციის მაგალითია აგრეთვე

$$y = \begin{cases} 1, & \text{როცა } x \text{ რაციონალურია,} \\ 0, & \text{როცა } x \text{ ირრაციონალურია,} \end{cases}$$

ტოლობებით მოცემული დირიხლეს\*\*) ფუნქცია, რომლის გრაფიკული წარმოდგენა შეუძლებელია.

**განსაზღვრა 5.1.3.**  $f(x)$  და  $g(x)$  ფუნქციების ჯამი, სხვაობა, ნამრავლი და განაყოფი შესაბამისად ეწოდება

$$f(x) + g(x), f(x) - g(x), f(x)g(x) \text{ და } \frac{f(x)}{g(x)}, g(x) \neq 0,$$

ფუნქციებს.


**განსაზღვრა 5.1.5.**  $f(x)$  და  $g(x)$  ფუნქციების რთული ფუნქცია (ფუნქციების კომპოზიცია) ეწოდება

$$f(g(x)) \equiv (f \circ g)(x)$$

ფუნქციას, რომელიც მიიღება  $f(x)$ -ის გამოსახულებაში ყველგან  $x$ -ის ნაცვლად  $g(x)$ -ის ჩასმით.

აღქმისთვის შეიძლება უფრო მარტივი იყოს რთული ფუნქციის შემდეგი წარმოდგენა: თუ გვაქვს

\*)



ვთქვათ,  $y = f(x)$  ფუნქცია ისეთია, რომ  $x$ -ის განსხვავებულ მნიშვნელობებს  $y$ -ის განსხვავებული მნიშვნელობები შეესაბამება. თუ  $y$ -ს შევუსაბამებთ ისეთ  $x$ -ს, რომლისთვისაც სრულდება  $y = f(x)$ , მაშინ მივიღებთ წესს, რომელიც მოგვცემს ფუნქციას, რომელსაც  $f$  ფუნქციის *შებრუნებული ფუნქცია* ეწოდება. ის აღინიშნება  $f^{-1}$  სიმბოლოთი და  $x = f^{-1}(y)$ .  $y = f^{-1}(x)$  (ცვლადები შევცვალეთ) ფუნქციის გრაფიკი მიიღება  $y = f(x)$  ფუნქციის გრაფიკის სარკული ასახვით  $y = x$  წრფის მიმართ, რადგან  $y = f(x)$  ფუნქციის ყოველ  $(x_0, y_0)$  დალაგებულ წყვილს სიბრტყეზე შეესაბამება  $y = f^{-1}(x)$  ფუნქციის  $(y_0, x_0)$  დალაგებული წყვილი სიბრტყეზე, რომელიც  $(x_0, y_0)$  წერტილის სარკული ასახვაა  $y = x$  წრფის მიმართ, რამდენადაც ნახაზზე დამტრინხული სამკუთხედების ტოლობიდან გამომდინარე, ამ წერტილების შემაერთებელ მონაკვეთს  $y = x$  წრფე შეაზე ყოფს.

\*\*) პ. გ. ლ. დირიხლე (1805 – 1859) – გერმანელი მათემატიკოსი.

$$z = f(y) \text{ და } y = g(x)$$

ფუნქციები, მაშინ

$$z = f(g(x)) = h(x)$$

წარმოადგენს რთულ ფუნქციას. ცხადია, რთული ფუნქციის განმარტება გულისხმობს, რომ პირველი ფუნქციის განსაზღვრის არე ემთხვევა მეორე ფუნქციის მნიშვნელობათა არეს (სიმრავლეს).

**განსაზღვრა 5.1.5.** ფუნქციას ეწოდება:

- ზრდადი, თუ  $f(x_1) < f(x_2)$ , როცა  $x_1 < x_2$ ;
- არაკლებადი, თუ  $f(x_1) \leq f(x_2)$ , როცა  $x_1 < x_2$ ;
- კლებადი, თუ  $f(x_1) > f(x_2)$ , როცა  $x_1 < x_2$ ;
- არაზრდადი, თუ  $f(x_1) \geq f(x_2)$ , როცა  $x_1 < x_2$ .

ფუნქციას მკაცრად მონოტონური ეწოდება, თუ ის ზრდადი ან კლებადია, და - მონოტონური, როცა ის არაკლებადი ან არაზრდადია.


**განსაზღვრა 5.1.6.** ფუნქციას ეწოდება ლუწი, თუ

$$f(-x) = f(x),$$


ხოლო კენტი, თუ

$$f(-x) = -f(x)$$

ყველა  $x$ -ისთვის, სადაც ფუნქცია განსაზღვრულია. ამასთან ორივე შემთხვევაში იგულისხმება, რომ  $f(x)$ -სთან ერთად  $f(-x)$ -იც განსაზღვრულია. სხვაგვარად რომ ვთქვათ,  $f(x)$  განსაზღვრული უნდა იყოს სიმეტრიულ  $]-a, a[$  ინტერვალზე (ღიაზე ან ჩაკეტილზე).



ნახ. 5.1.3



ნახ. 5.1.4


ლუწი ფუნქციის გრაფიკი ორდინატთა  $y$  ღერძის სიმეტრიულია (იხ. ნახ. 5.1.3). კენტი ფუნქციის გრაფიკი კოორდინატთა  $O$  სათავის სიმეტრიულია (იხ. ნახ. 5.1.4). ეს უკანასკნელი იმას ნიშნავს, რომ თუ  $P$  წერტილი ეკუთვნის გრაფიკს, მაშინ გრაფიკს ეკუთვნის  $P'$  წერტილიც, რომელიც  $P$  და  $O$  წერტილების შემაერთებელ წრფეზე მდებარეობს, ამასთან  $O$  წერტილი  $PP'$  სეგმენტის (მონაკვეთის) ცენტრია, ე.ი. თანაბრად დაშორებული სეგმენტის  $P$  და  $P'$  ბოლო წერტილებიდან.

**განსაზღვრა 5.1.7.**  $y = x^\alpha$ ,  $\alpha \in R^1$ , სახის ფუნქციას ხარისხოვანი ფუნქცია ეწოდება, სადაც  $x$  ფუძეა, ხოლო  $\alpha$  - ხარისხის მაჩვენებელი. ამ ფუნქციას ბიოლოგიაში მოდელირებისას

მრავალი გამოყენება აქვს. მაგალითად, ალტმანისა და ლიტმერის\*) მიერ დადგენილია შემდეგი მიახლოებითი ფორმულა

$$P = 200w^{-\frac{1}{4}},$$

რომელიც ძუძუმწოვრების  $P$  პულსს (გულის შეკუმშვათა რაოდენობას წუთში) წარმოადგენს როგორც  $w$  წონის (კგ-ში) ფუნქციას. როგორც ვხედავთ, მცირეწონიანი ცხოველების პულსი უფრო მაღალია, ვიდრე მძიმეწონიანი ცხოველების (იხ. ნახ. 5.1.5).



ნახ.5.1.5

**განსაზღვრა 5.1.8.**  $y = a^x$ ,  $a = \text{const} > 0$ , სახის ფუნქციას *მაჩვენებლიანი ფუნქცია* ეწოდება, სადაც  $a$  ფუძეა, ხოლო  $x$  — ხარისხის *მაჩვენებელი*. ის გვხვდება, მაგალითად, *მალთუსის*\*) *დისკრეტული მოდელის* ანალიზისას. ვთქვათ,  $n$ -ით აღნიშნულია ათწლეულის ნომერი რაიმე დროიდან (მაგალითად, 1790 წლიდან), ხოლო  $P_n$ -ით — მოსახლეობის რაოდენობა  $n$ -ურ ათწლეულში. მალთუსმა მოგვცა მოსახლეობის რაოდენობის განსაზღვრის შემდეგი მოდელი: მოცემულ ათწლეულში მოსახლეობის რაოდენობა მიიღება წინა ათწლეულში მოსახლეობის რაოდენობაზე ამ უკანასკნელისა და  $r$  საშუალო ზრდის კოეფიციენტის (ტემპის) ნამრავლის

დამატებით. მათემატიკურად ეს მოდელი ასე ჩაიწერება:

$$P_{n+1} = P_n + rP_n = (1+r)P_n. \tag{5.1.4}$$

ზრდის  $r$  ტემპი აშშ-ში 1790 წლიდან 1860 წლამდე 0,349-ის ტოლი იყო. (5.1.4)-დან ცხადია,

$$\begin{aligned} P_1 &= (1+r)P_0, \\ P_2 &= (1+r)P_1 = (1+r)^2 P_0, \\ &\dots \end{aligned} \tag{5.1.5}$$

$$P_n = (1+r)P_{n-1} = (1+r)^2 P_{n-2} = \dots = (1+r)^n P_0.$$

ამრიგად,

$$P_n = (1+r)^n P_0, \tag{5.1.6}$$

რაც იმაზე მიუთითებს, რომ მოსახლეობა იზრდება როგორც მაჩვენებლიანი ფუნქცია.

(5.1.6) ფორმულა შეიძლება უფრო მკაცრად დამტკიცდეს *მათემატიკური ინდუქციის პრინციპის* გამოყენებით, რომელიც შემდეგში მდგომარეობს:

$A$  მტკიცება, დამოკიდებული  $n$  ნატურალურ პარამეტრზე (ე. ი. მას  $A(n)$  სახე აქვს), დამტკიცებულად ითვლება, თუ სამართლიანია  $A(1)$ , და  $A(n)$ -ის სამართლიანობიდან გამომდინარეობს  $A(n+1)$ -ის სამართლიანობა.

მართლაც, ის, რომ (5.1.6) სამართლიანია  $n=1$ -სთვის, ცხადია (5.1.5)-დან. ახლა დავუშვათ მისი სამართლიანობა  $n$ -სთვის, ე. ი. ვუშვებთ (5.1.6)-ის სამართლიანობას და ვაჩვენოთ, რომ ის სამართლიანი იქნება  $(n+1)$ -ისთვისაც. (5.1.4) და (5.1.6)-დან ნათელია, რომ

$$P_{n+1} = (1+r)P_n = (1+r)(1+r)^n P_0 = (1+r)^{n+1} P_0.$$

\*) P. L. Altmann, D. M. Dittmer, eds. (1964) Biology Data Book. Federation of American Societies for Experimental Biology, pp. 234-235.

\*) თ. რ. მალთუსი (1766 – 1834) – ინგლისელი ეკონომისტი, მღვდელი.

**განსაზღვრა 5.1.9.** მოცემული  $A$  დადებითი რიცხვის ლოგარითმი  $a > 0$  ( $a \neq 1$ ) დადებითი ფუძით (აღინიშნება შემდეგნაირად:  $\log_a A$ ) ეწოდება ისეთ  $b$  რიცხვს, რომელშიც ახარისხებული  $a$  ფუძე გვაძლევს მოცემულ  $A$  რიცხვს ( $A = a^b$ ,  $\log_a A = b$ ,  $\lg A := \log_{10} A$ ,  $\ln A := \log_e A$ , სადაც  $e \approx 2,7$  ნეპერის რიცხვია).

ადვილი დასამტკიცებელია, რომ

$$1. a^{\log_a A} = A; \quad 2. \log_a 1 = 0, \quad 3. \log_a (A \cdot B) = \log_a A + \log_a B,$$

$$4. \log_a \left( \frac{A}{B} \right) = \log_a A - \log_a B, \quad 5. \log_a A^d = d \log_a A,$$

$$6. \log_a \sqrt[m]{A} = \frac{1}{m} \log_a A, \quad 7. \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a},$$

სადაც  $a, b, c, A, B$  დადებითი რიცხვებია,  $d$  ნამდვილი რიცხვია, ხოლო  $m$  – ნატურალური რიცხვი, ამასთან  $a \neq 1$ ,  $c \neq 1$ . მართლაც, პირველი გამომდინარეობს განმარტებიდან; მეორე ცხადია, რადგან ყოველი ნულისგან განსხვავებული რიცხვი ნულ ხარისხში ერთის ტოლია; მესამე გამომდინარეობს შემდეგი მსჯელობიდან: განმარტების თანახმად,

$$A = a^{\log_a A}, \quad B = a^{\log_a B},$$

რომელთა გამრავლებით მივიღებთ

$$AB = a^{\log_a A} a^{\log_a B} = a^{\log_a A + \log_a B},$$

საიდანაც  $a$  ფუძით გალოგარითმებით (ე.ი. ვიყენებთ ლოგარითმის განმარტებას) გვექნება

$$\log_a (A \cdot B) = \log_a A + \log_a B;$$

მეოთხე დამტკიცდება ანალოგიურად; მეხუთე გამომდინარეობს შემდეგი მსჯელობიდან:

$$A = a^{\log_a A},$$

ტოლობის ორივე მხარე ავიყვანოთ  $d$  ხარისხში, მივიღებთ

$$A^d = a^{d \log_a A},$$

საიდანაც  $a$  ფუძით გალოგარითმებით (ე.ი. ვიყენებთ ლოგარითმის განმარტებას) გვექნება

$$\log_a A^d = d \log_a A;$$

მეექვსე მეხუთის კერძო შემთხვევაა  $\left( d = \frac{1}{m} \right)$ ;

მეშვიდე გამომდინარეობს შემდეგი მსჯელობიდან: გავალოგარითმოთ  $c$  ფუძით

$$b = a^{\log_a b},$$

მივიღებთ

$$\log_c b = \log_a b \log_c a,$$

საიდანაც


$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}.$$

$\log_a x$  სახის ფუნქციას (ის განსაზღვრულია, როცა  $x > 0$ ) ლოგარითმული ფუნქცია ეწოდება.

ბავშვებში  $H$  სიმაღლესა (სმ-ში) და  $w$  წონას (კგ-ში) შორის კავშირი მოიცემა (იხ. ნახ. 5.1.6)

$$H(w) = 49,5 \ln w - 34,14$$

ფორმულით. ეს ფორმულა მიღებულია აშშ-ში 5-დან 13 წლამდე გოგონებზე დაკვირვების შედეგად.



ნახ. 5.1.6